

Sobre Desenvolvimentos em Séries de Potências, Séries de Taylor e Fórmula de Taylor

Pedro Lopes
Departamento de Matemática
Instituto Superior Técnico - Tagus Park
2o. Semestre 2009/2010

Estas notas constituem um material de apoio ao curso de Cálculo Diferencial e Integral I para as licenciaturas em Engenharia e Gestão Industrial e em Engenharia de Telecomunicações e Informática do Instituto Superior Técnico no Tagus Park, no 1o. semestre de 2021/2022 e não pretendem ser um substituto dos manuais escolares disponíveis.

1 Alguns Desenvolvimentos em Séries de Potências

Seja x um número real (não nulo) e considere-se a sucessão

$$u_n = x^n \quad n \geq 0$$

Considere-se uma nova sucessão, obtida de u_n , que designamos por S_N , que para cada N é a soma dos $N + 1$ primeiros termos de u_n , de $n = 0$ até $n = N$, isto é,

$$S_N = x^0 + x^1 + x^2 + x^3 + \cdots + x^{N-1} + x^N = \sum_{n=0}^N x^n$$

Embora seja fácil compreender o seu significado (soma dos $N + 1$ primeiros termos da sucessão u_n), tal como a sucessão S_N está escrita, não nos revela muito sobre o seu comportamento (é limitada?, é convergente?). Tentemos então escrevê-la de outra forma.

Tem-se,

$$S_{N+1} = \sum_{n=0}^{N+1} x^n = x^0 + x^1 + x^2 + \cdots + x^{N-1} + x^N + x^{N+1} = S_N + x^{N+1}$$

Por outro lado,

$$S_{N+1} = x^0 + x(x^0 + x^1 + \cdots + x^{N-2} + x^{N-1} + x^N) = 1 + xS_N$$

donde

$$1 + xS_N = S_N + x^{N+1} \Leftrightarrow 1 - x^{N+1} = S_N - xS_N = (1 - x)S_N$$

e portanto,

$$S_N = \frac{1 - x^{N+1}}{1 - x} \quad \text{para } x \neq 1$$

Consideremos desde já o caso $x = 1$:

$$S_N = \sum_{n=0}^N 1^N = \underbrace{1 + 1 + 1 + \cdots + 1}_{(N+1) \text{ parcelas}} = N + 1 \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} \infty$$

Agora para $x \neq 1$:

$$S_N = \frac{1 - x^{N+1}}{1 - x} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} \begin{cases} \frac{1}{1-x} & \text{para } |x| < 1 \\ \text{diverge para } |x| \geq 1 \end{cases}$$

ou seja

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N x^n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \begin{cases} \frac{1}{1-x} & \text{para } |x| < 1 \\ \text{diverge para } |x| \geq 1 \end{cases}$$

Acabámos então de ver que

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \text{para } |x| < 1$$

isto é desenvolvemos $f(x) = \frac{1}{1-x}$ em série de potências de x em torno de 0, obtendo, para $|x| < 1$, $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$. Deste desenvolvimento obtemos outros. Escrevamos então o mesmo desenvolvimento mas em ordem a uma nova variável y :

$$\frac{1}{1-y} = \sum_{n=0}^{\infty} y^n \quad \text{válido para } |y| < 1$$

Suponhamos agora que, dada uma constante a , $y = x - a$; então,

$$\frac{1}{1-(x-a)} = \sum_{n=0}^{\infty} (x-a)^n \quad \text{naturalmente válido para } |x-a| < 1$$

E se $y = -x$?

$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad \text{válido para } |-x| < 1 \quad (\Leftrightarrow |x| < 1)$$

ou seja, o desenvolvimento em série de potências de x de $\frac{1}{1+x}$ é:

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad \text{válido para } |x| < 1$$

E se $y = -x^2$?

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad \text{válido para } |-x^2| < 1 \quad (\Leftrightarrow |x| < 1)$$

ou seja obtivemos o desenvolvimento de

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad \text{válido para } |x| < 1$$

Definição 1.1 Considere uma série de potências,

$$\sum_{n=p}^{+\infty} c_n (x-a)^n.$$

- (i) O intervalo de convergência da série de potências é o conjunto dos pontos, x , para os quais a dita série converge.
- (ii) O raio da convergência da série, R , é tal que

$$\begin{aligned} x \in]a-R, a+R[&\implies \sum_{n=p}^{+\infty} c_n (x-a)^n \quad \text{converge} \\ x \in]-\infty, a-R[\cup]a+R, +\infty[&\implies \sum_{n=p}^{+\infty} c_n (x-a)^n \quad \text{diverge} \end{aligned}$$

Teorema 1.1 No interior do intervalo de convergência de uma série de potências de x ,

- (i) a derivada da série é igual à série das derivadas: $\left(\sum_{n=p}^{+\infty} c_n (x-a)^n \right)' = \sum_{n=p}^{+\infty} c_n ((x-a)^n)'$
- (ii) a primitiva da série é igual à série das primitivas: $\mathbf{P} \sum_{n=p}^{+\infty} c_n (x-a)^n = \sum_{n=p}^{+\infty} c_n \mathbf{P}(x-a)^n$.

Isto vai-nos permitir obter desenvolvimentos em série de potências de x das funções $\log(1+x)$ e $\arctan(x)$. De facto,

$$\log(1+x) = P \frac{1}{1+x} \Big|_{|x|<1} = P \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n P x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} + c$$

e notando que

$$0 = \log(1+0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} 0^{n+1} + c = 0 + c$$

vem $c = 0$, donde:

$$\log(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} \quad \text{para } |x| < 1$$

Tambem porque $(\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2}$ tem-se:

$$\arctan(x) = P \frac{1}{1+x^2} \Big|_{|x|<1} = P \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n P x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} + c$$

e como

$$0 = \arctan(0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} 0^{2n+1} + c = 0 + c$$

vem

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \quad \text{para } |x| < 1$$

Exercício 1.1

Calcular desenvolvimentos em série de potências de x de

$$a) \frac{1}{(1-x)^2} \quad b) \frac{2x}{(1-2x)^2}$$

Uma maneira de definir a função exponencial é:

$$e^x := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$$

que faz sentido para todo o x real, ou melhor, como a série em questão converge para todo o número real x então define um função de domínio \mathbb{R} . A essa função de x chamamos **exponencial de x** .

Proposição 1.1 *Seja (a_n) uma sucessão. Se existe*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

(chamemos-lhe R) então a série de potências

$$\sum_{n=p}^{\infty} a_n (x-a)^n$$

converge absolutamente para todo o x em $]a-R, a+R[$ e diverge para todo o x em $]-\infty, a-R[\cup]a+R, \infty[$; a convergência em $x = \pm R$ tem que ser averiguada para cada caso específico de a_n .

Verifique que o intervalo de convergência de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$ é \mathbf{R} .

Nesta abordagem informal, introduzamos ix na definição acima de exponencial (onde $i^2 = -1$):

$$e^{ix} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (ix)^n$$

Notando que

$$\begin{aligned} i^0 &= 1, & i^1 &= i, & i^2 &= -1, & i^3 &= -i, \\ i^4 &= 1, & i^5 &= i, & i^6 &= -1, & i^7 &= -i, \\ & \dots & & & & & & \end{aligned}$$

então para n par, isto é, para $n = 2k$, para algum k inteiro,

$$i^n = i^{2k} = (-1)^k$$

enquanto que para n ímpar, isto é, para $n = 2k + 1$, para algum k inteiro,

$$i^n = i^{2k+1} = (-1)^k \cdot i$$

Assim,

$$e^{ix} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (ix)^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$$

e lembrando que

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$$

vem

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$$

e

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$$

2 Séries de Taylor

Dada uma função indefinidamente diferenciável num certo ponto a interior ao seu domínio (isto é, existe e é finita a derivada de qualquer ordem de f em $x = a$, $f^{(n)}(a)$) podemos sempre escrever a sua série de Taylor relativa a a :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

Qual a relação entre esta série de Taylor e a função f que usámos para calcular os coeficientes da série? Na primeira secção procurou-se mostrar entre outras coisas que funções transcendentais (no caso, exponencial, seno, coseno, logaritmo e arco de tangente) podem ser expressas como séries de potências (pelo menos nalguns subconjuntos do seu domínio) e recordou-se que as séries de potências são diferenciáveis e integráveis termo a termo evidenciando assim a importância de poder exprimir uma função à custa de uma série de potências. Retomando o assunto em discussão, seria desejável que a série de Taylor convergisse para a função que lhe deu origem, pelo menos nalguma vizinhança de a . Começemos por definir

Definição 2.1

Uma função $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diz-se **analítica num ponto a de D** se é igual a uma série de potências de $x - a$ nalguma vizinhança de a , isto é, se

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n \quad \text{para } x \text{ "próximo" de } a$$

Assim, e sabendo que uma série de potências pode ser diferenciada termo a termo no interior do seu intervalo de convergência, os c_n 's são as n -ésimas derivadas de f em a multiplicadas por $n!$:

$$\begin{aligned} f'(a) &= \left(c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n (x-a)^n \right)' \Big|_{x=a} = 0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \left((x-a)^n \right)' \Big|_{x=a} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n n (x-a)^{n-1} \Big|_{x=a} = \\ &= c_1 \cdot 1 + \sum_{n=2}^{\infty} c_n n (a-a)^{n-1} = c_1 + 0 = c_1 \end{aligned}$$

Exercício 2.1

Calcule $f^{(2)}(a)$, $f^{(3)}(a)$, $f^{(4)}(a)$ e $f^{(n)}(a)$.

Portanto, funções analíticas num ponto a são indefinidamente diferenciáveis em a . A pergunta que fizemos acima pode agora reformular-se da seguinte maneira: Será que todas as funções indefinidamente diferenciáveis num ponto a são analíticas em a ? A resposta é não, nem todas, como o seguinte exemplo ilustra,

Exemplo 2.1

Seja

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Esta função é indefinidamente diferenciável em qualquer x , com todas as derivadas nulas em $x = 0$, isto é, $f^{(n)}(0) = 0$ qualquer que seja o n . A sua série de Taylor em torno de 0 (série de Mac-Laurin) será então a série idênticamente nula:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 0 \cdot x^n = \sum_{n=0}^{\infty} 0 = 0$$

Por outro lado, $f(x)$ só é nula em $x = 0$, donde a série de Mac-Laurin de f não converge para a função em nenhuma vizinhança de 0.

Como reconhecer as funções indefinidamente diferenciáveis num ponto a que são analíticas nesse ponto a ? O seguinte resultado dá-nos um critério para as distinguir:

Teorema 2.1 *Seja f indefinidamente diferenciável numa vizinhança de um ponto a . Se existirem um número real M e uma vizinhança $V_\epsilon(a)$ tais que, para cada $x \in V_\epsilon(a)$ e para cada inteiro positivo n se tenha*

$$|f^{(n)}(x)| \leq M$$

então f é igual à sua série de Taylor em torno de a para todo o $x \in V_\epsilon(a)$:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n$$

Dem. Omitida (ver livro do Prof. Campos Ferreira) ■

Mais prosaicamente, se uma função indefinidamente diferenciável tem todas as suas derivadas **globalmente** limitadas nalguma vizinhança de a , então, nessa vizinhança de a , a função é igual à sua série de Taylor.

Exemplo 2.2

As funções (indefinidamente diferenciáveis) $\sin(x)$ e $\cos(x)$ são tais que as suas derivadas são sempre uma das seguintes funções: $\sin(x)$, $\cos(x)$, $-\sin(x)$ ou $-\cos(x)$. Assim os módulos de tais funções, $|\sin(x)|$ e $|\cos(x)|$, são limitados por 1, qualquer que seja o x ,

$$|\sin(x)| \leq 1, \quad |\cos(x)| \leq 1 \quad \text{qualquer que seja o } x \text{ em } \mathbb{R}$$

3 Fórmula de Taylor

...e se f não for indefinidamente diferenciável em a ? Isto é, se f só admitir n derivadas no ponto a ? Então vale a fórmula de Taylor

$$f(x) = f(a) + (x - a)f'(a) + \frac{(x - a)^2}{2} f''(a) + \frac{(x - a)^3}{3!} f'''(a) + \dots + \frac{(x - a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + r_n(x)$$

onde $r_n(x)$ é uma função de x tal que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{r_n(x)}{(x - a)^n} = 0$$

Observação 3.1

Se $a = 0$, a fórmula correspondente chama-se fórmula de Mac-Laurin.

Observação 3.2

As funções, como o resto de ordem n , $r_n(x)$, que, quando divididas por outra função e tomando o limite quando x tende para um certo a se obtém 0, têm uma designação especial:

$$f(x) = o(g(x)), \quad x \mapsto a \quad (\text{leia-se "f(x) é ó pequeno de g(x) quando x tende para a"}) \quad \stackrel{\text{def.}}{\iff} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

Assim, podemos escrever

$$r_n(x) = o((x - a)^n), \quad x \mapsto a$$

3.1 Fórmula de Taylor com resto de Lagrange

Se f for $n + 1$ vezes diferenciável em a tem-se a seguinte fórmula para o resto (conhecida por fórmula do resto de Lagrange):

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1}$$

com ξ estritamente entre x e a . Assim a fórmula de Taylor fica:

$$f(x) = f(a) + (x - a)f'(a) + \frac{(x - a)^2}{2}f''(a) + \frac{(x - a)^3}{3!}f'''(a) + \dots + \frac{(x - a)^n}{n!}f^{(n)}(a) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - a)^{n+1}$$

com ξ estritamente entre x e a .

3.1.1 Exemplo de aplicação

Suponhamos que queremos calcular $\sqrt{99}$ com um erro de menos de três casas decimais:

$$\sqrt{99} = \sqrt{100 - 1} = \sqrt{100 \left(1 - \frac{1}{100}\right)} = 10\sqrt{1 - \frac{1}{100}}$$

Assim, fica evidenciado que pretendemos calcular a função

$$f(x) = 10\sqrt{1 + x}$$

no ponto $x = -\frac{1}{100}$. Por outro lado, $-\frac{1}{100}$ é um número bastante pequeno, quase zero. Então usamos a fórmula de Taylor para f em $a = 0$:

$$f(x) = 10\sqrt{1 + x}; \quad f(0) = 10\sqrt{1 + 0} = 10$$

$$f'(x) = \left(10\sqrt{1 + x}\right)' = 10 \frac{1}{2}(1 + x)^{-\frac{1}{2}} = 5(1 + x)^{-\frac{1}{2}}; \quad f'(0) = 5$$

$$f''(x) = \left(5(1 + x)^{-\frac{1}{2}}\right)' = -\frac{5}{2}(1 + x)^{-\frac{3}{2}} = -\frac{5}{2} \frac{1}{(1 + x)^{\frac{3}{2}}}; \quad f''(\xi) = -\frac{5}{2} \frac{1}{(1 + \xi)^{\frac{3}{2}}}$$

Então, aplicando a fórmula de Taylor de grau 1 com resto de Lagrange de grau 1 tem-se:

$$10\sqrt{1 + x} = 10 + 5x + \frac{-\frac{5}{2} \frac{1}{(1 + \xi)^{\frac{3}{2}}}}{2!} x^2 = 10 + 5x - \frac{5}{4} \frac{1}{(1 + \xi)^{\frac{3}{2}}} x^2$$

donde,

$$\sqrt{99} = 10\sqrt{1 - \frac{1}{100}} \approx (10 + 5x) \Big|_{x = -\frac{1}{100}} = 10 - \frac{5}{100} = 10 - \frac{1}{20} = \frac{199}{20} = 9.95$$

com erro:

$$\begin{aligned} \left| 10\sqrt{1+x} - (10+5x) \right| \Big|_{x=-\frac{1}{100}} &= \left| -\frac{5}{4} \frac{1}{(1+\xi)^{\frac{3}{2}}} x^2 \right| \Big|_{x=-\frac{1}{100}} \left(-\frac{1}{100} < \xi < 0 \right) \\ &\leq \frac{5}{4} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{100}\right)^{\frac{3}{2}}} \left(-\frac{1}{100}\right)^2 = \frac{5}{4} \left(\frac{100}{99}\right)^{\frac{3}{2}} 10^{-4} \leq \frac{5}{4} \cdot 2 \cdot 10^{-4} = .00025 \end{aligned}$$

que é, portanto, um erro inferior a 10^{-3} , como pretendíamos.

3.2 Fórmula de Taylor com resto de Peano

Se f for, mais uma vez, $n+1$ vezes diferenciável em a tem-se a seguinte fórmula para o resto (conhecida por fórmula do resto de Peano):

$$r_n(x) = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \left(f^{(n+1)}(a) + \alpha_n(x) \right)$$

onde $\alpha_n(x)$ é uma função de x tal que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \alpha_n(x) = 0$$

3.2.1 Aplicação: Estudo de Extremos

Se f é uma função diferenciável, os pontos críticos, isto é, os pontos x onde $f'(x) = 0$, são um ponto de partida para o estudo dos extremos de f . Recordamos ainda:

Definição 3.1 *Seja $f : D \subset \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ uma função e $a \in D$. Suponha ainda que existe $\epsilon > 0$ tal que*

$$x \in V_\epsilon(a) \quad \implies \quad f(x) \leq f(a) \quad (f(x) \geq f(a), \text{ respectivamente}).$$

Então, f tem máximo (respectivamente, mínimo) local em a .

Suponhamos que f é duas vezes diferenciável em a e $f'(a) = 0$. Então a fórmula de Taylor aplicada a f no ponto a com resto de Peano é:

$$f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2} \left(f''(a) + \alpha_1(x) \right) = f(a) + \frac{(x-a)^2}{2} \left(f''(a) + \alpha_1(x) \right)$$

já que $f'(a) = 0$ e portanto

$$f(x) - f(a) = \frac{(x-a)^2}{2} \left(f''(a) + \alpha_1(x) \right)$$

Se f tem um extremo local em a , então $f(x) - f(a)$ tem sinal constante nalguma vizinhança de a porque ou $f(x) \geq f(a)$ (mínimo local) ou $f(x) \leq f(a)$ (máximo local), nalguma vizinhança de a . Pretendemos, então, conhecer o sinal de $f(x) - f(a)$, numa vizinhança de a . Isso vai-nos ser facilitado pelo conhecimento do sinal de $f''(a)$, dada a igualdade acima. De facto, já que $(x-a)^2 \geq 0$ então o sinal de $f(x) - f(a)$ é dado por $f''(a) + \alpha_1(x)$. Suponhamos então que $f''(a) \neq 0$. Como $\lim_{x \rightarrow a} \alpha_1(x) = 0$ então por definição de limite, para todo o $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, sempre que $x \in V_\delta(a)$ $|\alpha_1(x) - 0| < \epsilon$, ou seja $|\alpha_1(x)| < \epsilon$. Com $\epsilon = |f''(a)| (> 0)$, existirá então $\delta > 0$ tal que para todo o $x \in V_\delta(a)$, $|\alpha_1(x)| < |f''(a)|$ e portanto o sinal de $f''(a) + \alpha_1(x)$ é o sinal de $f''(a)$, nessa vizinhança. Então se $f''(a) > 0$ o sinal de $f(x) - f(a)$ é positivo e portanto ocorre um mínimo em $x = a$; se $f''(a) < 0$ o sinal de $f(x) - f(a)$ é negativo e portanto ocorre um máximo em $x = a$.

Se $f''(a) = 0$ usamos a fórmula de Taylor de ordem dois:

$$f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2} f''(a) + \frac{(x-a)^3}{3!} \left(f'''(a) + \alpha_2(x) \right) = f(a) + \frac{(x-a)^3}{3!} \left(f'''(a) + \alpha_2(x) \right)$$

Mais uma vez, queremos saber o sinal de $f(x) - f(a)$ “junto” a a . Começemos por supor que $f'''(a) \neq 0$. Tem-se:

$$f(x) - f(a) = \frac{(x-a)^3}{3!} \left(f'''(a) + \alpha_2(x) \right)$$

mas como $(x-a)^3$ muda de sinal quando x “passa” por a , então f não tem extremo em a . Se $f'''(a) = 0$, então utilizar-se-ia a fórmula de Taylor de ordem 3 e assim por diante. Enunciamos então o seguinte:

Teorema 3.1 *Seja f n vezes diferenciável em a (com $n \geq 2$) e tal que*

$$0 = f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) \quad e \quad f^{(n)}(a) \neq 0$$

- (i) *Se n é par, $f(a)$ é máximo local se $f^{(n)}(a) < 0$ e é mínimo local se $f^{(n)}(a) > 0$*
 (ii) *Se n é ímpar, f não tem extremo local em a*

Dem. A fórmula de Taylor de ordem $n - 1$ para f em a com resto de Peano é:

$$f(x) = f(a) + \frac{(x-a)^n}{n!} \left(f^{(n)}(a) + \alpha_{n-1}(x) \right)$$

Se n é par, então $(x-a)^n \geq 0$ e argumentando como acima concluímos que ocorre máximo em a se $f^{(n)}(a) < 0$ e mínimo se $f^{(n)}(a) > 0$. Analogamente para n ímpar. ■

Recordamos também:

Definição 3.2 *Seja $f : D \subset \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ uma função e $a \in D$. Suponha ainda que existe $\epsilon > 0$ tal que*

$$x \in V_\epsilon(a) \quad \implies \quad f(x) \geq f(a) + f'(a)(x-a) \quad (f(x) \leq f(a) + f'(a)(x-a), \text{ respectivamente}).$$

Então, f é convexa (respectivamente, côncava) em a .

Quanto à concavidade de uma função diferenciável num ponto a , a análise que se faz é analoga a que acabámos de fazer. Queremos agora é estudar o sinal da função $f(x) - g(x)$, (onde $g(x) = (f(a) + (x-a)f'(a))$). O facto de o sinal da função $f(x) - g(x)$ ser negativo, pelo menos numa vizinhança de a , diz-nos que a função f está, nessa vizinhança, sempre abaixo da tangente no ponto a (concavidade voltada para baixo (côncava); ver exemplo na figura 1) e no caso de ser positivo, que a função está acima da tangente no ponto a (concavidade voltada para cima; convexa). Temos então:

Teorema 3.2 *Seja f n vezes diferenciável em a (com $n \geq 2$) e tal que*

$$0 = f''(a) = f'''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) \quad e \quad f^{(n)}(a) \neq 0$$

- (i) *Se n é par, f é côncava em a se $f^{(n)}(a) < 0$ e é convexa em a se $f^{(n)}(a) > 0$*
 (ii) *Se n é ímpar, f tem ponto de inflexão em a*

Dem. Omitida. ■

4 Outra maneira de definir derivada

Dada f diferenciável num ponto a , podemos escrever a sua fórmula de Taylor de ordem 1 relativamente a esse ponto a :

$$f(x) = f(a) + f'(a) \cdot (x-a) + r_1(x) \quad \text{com} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{r_1(x)}{x-a} = 0$$

Suponhamos agora que, dada uma função f definida numa vizinhança de a , existe um número real γ e uma função $r_1(x)$ tal que

$$f(x) = f(a) + \gamma \cdot (x-a) + r_1(x) \quad \text{com} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{r_1(x)}{x-a} = 0$$

Então

$$f(x) - f(a) = \gamma \cdot (x-a) + r_1(x) \implies \frac{f(x) - f(a)}{x-a} = \frac{\gamma \cdot (x-a) + r_1(x)}{x-a} = \gamma + \frac{r_1(x)}{x-a}$$

e portanto

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \left(\gamma + \frac{r_1(x)}{x-a} \right) = \gamma + \lim_{x \rightarrow a} \frac{r_1(x)}{x-a} = \gamma + 0 = \gamma$$

ou seja f é diferenciável em a com $f'(a) = \gamma$.




Figure 1: f diferenciável em a e a tangente ao gráfico de f em a .

Provamos então que f é diferenciável em a é equivalente a dizer que existe um número real, chamemos-lhe γ , e uma função $r_1(x)$, tal que

$$f(x) = f(a) + \gamma \cdot (x - a) + r_1(x) \quad \text{com} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{r_1(x)}{x - a} = 0$$

Reescrevendo esta expressão na forma

$$f(x) - f(a) = \gamma \cdot (x - a) + r_1(x) \quad \text{com} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{r_1(x)}{x - a} = 0$$

podemos dizer desta função que $f(x) - f(a)$ é aproximadamente linear em $x - a$:

$$f(x) - f(a) \approx \gamma \cdot (x - a)$$

e que essa aproximação é tanto melhor quanto mais próximo de a x estiver - já que $r_1(x)$ tende para zero mais rapidamente que $x - a$ quando x tende para a . Doutra forma ainda, a “distância” de $f(x)$ a $f(a)$ é, aproximadamente, uma função linear da “distância” de x a a .

Em cursos subsequentes, estudaremos funções de várias variáveis, em particular funções reais de várias variáveis reais, por exemplo,

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \quad \text{para todo o } x \text{ e } y \text{ reais}$$

O que significará “diferenciável num ponto (a, b) ” para uma função deste tipo? Note-se que **NÃO** vai ser possível calcular

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} \frac{f(x, y) - f(a, b)}{(x, y) - (a, b)}$$

pois desde logo **NÃO** está definida uma operação de divisão nestes conjuntos. Como vimos atrás, havia já em \mathbb{R} uma outra maneira (equivalente) de definir derivada num ponto. Seria aqui dizer que a “distância” de $f(x, y)$ a $f(a, b)$ é, aproximadamente, uma função linear da “distância” de (x, y) a (a, b) . É, de facto, esta a maneira que usaremos para definir derivada num ponto para estas novas funções, como se verá.

5 Exercícios Propostos

1. Determine os desenvolvimentos em série de Mac-Laurin das seguintes funções e diga onde são válidos

$$a) 2 \sin(3x) \quad b) e^{-x^2} \quad c) a^x (a > 0) \quad d) \sinh(x) \quad e) \cosh(x)$$

$$f) \frac{1}{2-x} \quad g) \frac{1}{2+3x^2} \quad h) \frac{2x^3}{3-x^2} \quad i) \frac{1-x}{e^{x-1}} \quad j) \sin(x) \cos(x)$$

$$k) (1+x) \log(1+x) \quad l) \sin^2(x) \quad m) \cos^2(x)$$

2. Determine as dez primeiras derivadas na origem de

$$x^2 \log(1-x^3)$$

3. Determine a soma das seguintes séries:

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n} \quad b) \sum_{n=0}^{\infty} n x^n \quad c) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+3)!}$$

4. Estabeleça os seguintes desenvolvimentos

$$a) \log \frac{1+x}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x^{2n-1}}{2n-1} \quad \text{para } |x| < 1$$

$$b) \frac{x}{1+x-2x^2} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} (1 - (-2)^n) x^n \quad \text{para } |x| < 1$$

$$c) \frac{12-5x}{6-5x-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^n}{6^n}\right) x^n \quad \text{para } |x| < 1$$

5. Usando um polinômio de Taylor de grau 1, obtenha valores aproximados dos números seguintes, dando uma estimativa do erro cometido em cada caso:

$$a) \sqrt[3]{28} \quad b) \sqrt[5]{33} \quad c) \log(1.003) \quad d) e^{-0.2}$$

6. Esboce os gráficos de

$$a) x + \cos(x) \quad b) \frac{\sin(2x)}{1 - \cos(2x)} \quad c) \log\left(\arctan\left(\frac{x+1}{x-2}\right)\right)$$